

BULLETIN
du MUSÉUM NATIONAL
d'HISTOIRE NATURELLE

PUBLICATION BIMESTRIELLE

zoologie

284

N° 407 SEPTEMBRE - OCTOBRE 1976

BULLETIN
du
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

57, rue Cuvier, 75005 Paris

Directeur : Pr M. VACHON.

Comité directeur : Prs J. DORST, C. LÉVI et R. LAFFITTE.

Rédacteur général : Dr M.-L. BAUCHOT.

Secrétaire de rédaction : M^{me} P. DUPÉRIER.

Conseiller pour l'illustration : Dr N. HALLÉ.

Le *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, revue bimestrielle, paraît depuis 1895 et publie des travaux originaux relatifs aux diverses branches de la Science.

Les tomes 1 à 34 (1895-1928), constituant la 1^{re} série, et les tomes 35 à 42 (1929-1970), constituant la 2^e série, étaient formés de fascicules regroupant des articles divers.

A partir de 1971, le *Bulletin* 3^e série est divisé en six sections (Zoologie — Botanique — Sciences de la Terre — Sciences de l'Homme — Sciences physico-chimiques — Écologie générale) et les articles paraissent, en principe, par fascicules séparés.

S'adresser :

- pour les **échanges**, à la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (C.C.P., Paris 9062-62) ;
- pour les **abonnements** et les **achats au numéro**, à la Librairie du Muséum, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (C.C.P., Paris 17591-12 — Crédit Lyonnais, agence Y-425) ;
- pour tout ce qui concerne la **rédaction**, au Secrétariat du *Bulletin*, 57, rue Cuvier, 75005 Paris.

Abonnements pour l'année 1976

ABONNEMENT GÉNÉRAL : France, 530 F ; Étranger, 580 F.

ZOOLOGIE : France, 410 F ; Étranger, 450 F.

SCIENCES DE LA TERRE : France, 110 F ; Étranger, 120 F.

BOTANIQUE : France, 80 F ; Étranger, 90 F.

ÉCOLOGIE GÉNÉRALE : France, 70 F ; Étranger, 80 F.

SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES : France, 25 F ; Étranger, 30 F.

International Standard Serial Number (ISSN) : 0027-4070.

Cycle biologique de *Parasymphylodora markewitschi* (Kulakovskaya, 1947) (Trematoda Digenea, Monorchiiidae)

par Monique LAMBERT *

Résumé. — Étude du cycle de *Parasymphylodora markewitschi* (Kulakovskaya, 1947), Trématode parasite de l'intestin postérieur du Téléostéen *Leuciscus cephalus* L. (Cyprinidae). Les cercariaeum se développent dans des redies infestant un Mollusque Prosobranch : *Bythinia tentaculata* L. On décrit le mode d'infestation et l'enkystement de la métacercarie chez deux autres Gastéropodes : *Limnaea limosa* L. et *Bythinia tentaculata* L.

Abstract. — Life history of *Parasymphylodora markewitschi* (Kulakovskaya, 1947) (Digenea : Monorchiiidae).

The life history of *Parasymphylodora markewitschi* Kulakovskaya, 1947, Trematoda occurring in the hindgut of the Teleostean fish *Leuciscus cephalus* L. (Cyprinidae) is studied. The cercariae develop into rediae infecting the Prosobranchi mollusc, *Bythinia tentaculata* L. The transmission pattern and the metacercarian encystment are described also in two other Gasteropoda : *Limnaea limosa* L. and *Bythinia tentaculata* L.

Asymphylodora markewitschi a été découvert par KULAKOVSKAYA en 1947 chez *Leuciscus cephalus*, en Russie, dans le fleuve Dnieper. Nous avons retrouvé ce parasite, chez ce même hôte, dans les rivières du Midi de la France. Nous avons découvert dans les conditions naturelles les différents stades larvaires et réalisé expérimentalement le cycle évolutif de ce Digène. L'étude des formes larvaires permet de placer ce Trématode dans le genre *Parasymphylodora*.

Parasymphylodora markewitschi (Kulakovskaya, 1947)

HÔTE : *Leuciscus cephalus* L.

HABITAT : intestin postérieur.

LOCALITÉ : Cadoules, rivière côtière de la région de Montpellier, se jetant dans l'étang de l'Or.

ADULTE

Matériel étudié : 53 individus montés *in toto*, 5 débités en coupes sériées.

Le corps, aplati dorso-ventralement, allongé, mesure en moyenne 1,300 mm de longueur (0,940 — 1,700 mm) et 0,458 mm de largeur (0,375 — 0,555 mm). Il présente un tegument épineux sur la face ventrale jusqu'au niveau de l'ovaire.

* Laboratoire de Parasitologie Comparée, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, F 34060 Montpellier Cedex.

La ventouse orale ($184 \times 157 \mu\text{m}$) est légèrement plus petite que la ventouse ventrale ($198 \times 176 \mu\text{m}$). Le rapport des ventouses, VO/VV, est égal à 0,897.

L'appareil digestif, qui débute au fond de la ventouse orale, se continue après un prépharynx court mais net ($47 \mu\text{m}$) par un pharynx globuleux ($103 \times 82 \mu\text{m}$) et un court œsophage. Celui-ci se divise ensuite, en avant de la ventouse ventrale, en 2 longs cœcums qui dépassent, légèrement vers l'arrière, l'équateur du testicule.

De l'appareil excréteur, seule la vessie est visible. Elle a une paroi épaisse et une forme allongée, tubulaire et flexueuse (caractère que nous retrouverons chez les stades larvaires).

L'appareil génital mâle comprend un testicule unique, allongé longitudinalement ($352 \times 173 \mu\text{m}$), et situé dans la moitié postérieure du corps. De sa partie antérieure, partent vers l'avant 2 canaux déférents qui se rejoignent juste avant de pénétrer dans la poche du cirre. Celle-ci, petite ($169 \times 92 \mu\text{m}$), est située sur le côté gauche du corps. Le




FIG. 1 et 2. — *Parasynphylodora markewitschi* (Kulakovskaya, 1947) : 1, organisation générale de l'adulte en vue ventrale ; les œufs ne sont pas représentés dans l'utérus ; 2, rhabdite.

cirre légèrement spinuleux, évaginable, aboutit à l'atrium génital qui s'ouvre ventralement, à mi-chemin entre la ventouse ventrale et le bord gauche du corps.

L'ovaire ovalaire ($164 \times 115 \mu\text{m}$) est situé à droite, juste en avant du testicule. L'oviducte qui en est issu reçoit le conduit d'un petit réceptacle séminal. De ce carrefour génital part le canal de Laurer qui remonte et vient déboucher dorsalement au niveau du bord postérieur de l'acetabulum. Les glandes vitellogènes forment, de chaque côté du corps, des amas de follicules allant de la partie antérieure de l'ovaire au milieu du testicule. Elles semblent moins étendues vers l'arrière du côté droit. Les vitelloductes transverses passent entre le testicule et l'ovaire et s'unissent pour former le vitelloducte médian qui se jette dans l'oviducte.

L'utérus décrit, dorsalement, de nombreuses boucles dans la région postérieure jusqu'en arrière du testicule. Il remonte pour former une anse en avant de l'acetabulum. Il passe ensuite sur le côté gauche du corps et vient s'ouvrir dans l'atrium génital à côté de la poche du cirre. Dans sa portion terminale, il donne un petit métraterme légèrement épineux.

Les œufs operculés, très nombreux, sont de couleur brun-jaune, et mesurent en moyenne $24 \times 15 \mu\text{m}$.

STADES LARVAIRES

Les œufs, rejetés avec les fèces du Chevaine *Leuciscus cephalus*, libèrent un miracidium qui pénètre dans un Mollusque Prosobranch : *Bythinia tentaculata* L., où il donne naissance à des rédies.

Rédies

Les rédies allongées mesurent en moyenne 1,312 mm de longueur (0,697 — 1,759 mm) et 0,354 mm de largeur (0,216 — 0,528 mm). Elles sont dépourvues d'apophyses latérales. Au pharynx globuleux ($74 \times 62 \mu\text{m}$) fait suite un petit tube digestif sacciforme qui occupe, dans la partie antérieure, presque toute la largeur de la rédie ($326 \times 198 \mu\text{m}$). Il est rempli d'une substance brunâtre.

Le système excréteur est formé de très nombreuses cellules flammes groupées en grappes aux extrémités antérieure et postérieure. Les canalicules ne sont pas visibles mais nous avons distingué, de chaque côté, un collecteur antérieur et un collecteur postérieur qui s'unissent en un tronc commun débouchant latéralement à un pore excréteur. Le nombre de protonéphridies est variable (grappes de 6, 8, 10 et même 12).

Les rédies, localisées superficiellement dans le tortillon, renferment une dizaine de cercariaeum mais un ou deux seulement, prêts à être émis, sont mobiles.

Cercariaeum

Les stades larvaires de la sous-famille des Asymphylodorinae issus des rédies appartiennent à un groupe particulier. En effet, ces formes sont dépourvues de queue. Elles constituent le groupe des cercariaeum.

Le cercariaeum de *Parasymphylodora markewitschi* correspond au groupe *Parasquamosum*. En 1970, BYCHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA et KULAKOVA caractérisent ce groupe par une vessie tubulaire et flexueuse, un seul testicule et un système excréteur de formule : $2 [(3 + 3 + 3) + (3 + 3 + 3)] = 36$.

Le cercariaeum de *Parasymphylodora markewitschi* a un corps transparent allongé (714 — 1 162 μm de long et 432 — 681 μm de large). Il présente, sur le vivant, dans la partie postérieure, une tache blanchâtre, correspondant à une grande vessie sinueuse.

La ventouse orale (106 \times 98 μm) est légèrement plus petite que la ventouse ventrale (125 \times 118 μm). Le rapport VO/VV est égal à 0,856.

À l'extrémité antérieure, au-dessus de la ventouse orale, se trouve un tout petit stylet (6 — 8 μm) à une seule pointe. Le tégument est recouvert de fines épines disposées ventralement sur les deux tiers antérieurs du corps. 15 à 18 glandes de pénétration sont localisées, de chaque côté du corps, entre le pharynx et la ventouse ventrale. Leurs canaux remontent vers la partie antérieure et passent dorsalement pour venir déboucher sur le bord supérieur de la ventouse orale de part et d'autre du stylet.

Le prépharynx, assez court, s'ouvre dans la ventouse orale. Le pharynx globuleux (64 \times 48 μm) est prolongé par un œsophage relativement bref qui se divise en avant de la ventouse ventrale en 2 branches qui atteignent le tiers postérieur du corps.

La vessie excrétrice tubulaire, à parois épaisses (épithéliocystid), est longue et flexueuse. Elle débute au niveau du bord antérieur du testicule et débouche à l'extrémité postérieure du corps. Le système excréteur peut être représenté par la formule : $2 [(3 + 3 + 3) + (3 + 3 + 3)] = 36$.

Nous avons pu constater chez certains cercariaeum une multiplication des cellules flammes. Les groupes initiaux de 3 protonéphridies passent parfois à 4, 5, 6, ou 7. Ceci complique beaucoup la disposition du système excréteur. Nous pensons que cette multiplication tend à prouver que le cercariaeum n'est pas une « cercaire » typique, mais un stade intermédiaire entre cercaire et métacercaire.

Ce qui semble confirmer le système génital déjà entièrement formé où le testicule mesure 110 \times 50 μm , la poche du cirre 90 \times 28 μm et l'ovaire 45 \times 40 μm .

Nous avons eu des difficultés pour interpréter la chétotaxie de cette larve. Il existe une multitude de sensilles qui ne sont déjà plus symétriques. J. RICHARD (1971) dit que le cercariaeum de *Asymphylodora tincae* « présente un grand nombre de taches ressemblant à des papilles. Celles-ci sont réparties apparemment sans ordre sur 6 axes longitudinaux et sont numériquement variables d'un individu à l'autre sauf en ce qui concerne les cycles C I et C II ». Elle note aussi : « la présence d'un grand nombre d'éléments imprégnés est caractéristique des cercaires dont l'enkystement est rapide ».

Pour nous, tout ceci est encore en faveur de l'hypothèse considérant le cercariaeum comme stade intermédiaire.

Les balles germinatives se développant dans les rédies passent d'une dimension de 48 \times 37 μm à une taille de 132 \times 72 μm . Nous avons pu suivre l'apparition des différents organes du cercariaeum. Le tube digestif avec le pharynx se forment chez les larves mesurant 160 \times 80 μm . Apparaissent ensuite les ventouses puis les canaux des glandes de pénétration. Lorsque les glandes, la vessie et les organes génitaux sont différenciés, le cercariaeum mûr et mobile est prêt à être émis.




FIG. 3-5. — *Parasympylodora markewitschi* (Kulakovskaya, 1947), cercariaeum : 3, organisation générale, vue ventrale ; 4, système excréteur initial, vue dorsale ; 5, système excréteur à un stade plus avancé, vue dorsale.

Comportement

Les cercariaeum étant des formes larvaires acerques, leur seul moyen de déplacement est la reptation grâce aux ventouses.

D'après DUBOIS (1929), ces larves atteignent ainsi en rampant le 2^e hôte intermédiaire. Nos observations prouvent que l'infestation du 2^e hôte ne résulte pas du déplacement des cercariaeum sur le substrat, mais d'un comportement très particulier.

Dès leur émission, les cercariaeum se déplacent sur le corps du *Bythinia* et atteignent un tentacule à l'extrémité duquel ils se fixent grâce à leur ventouse ventrale. La ventouse orale reste libre et mobile. Nous les avons observés en grand nombre dans cette position, les tentacules ayant alors un aspect plumeux (phénomène déjà observé par WESENBERG-LUND (1934) et SZIDAT (1943) pour *Cercariaeum paludinae impurae* ; par BIGUET, DEBLOCK et CAPRON (1956) pour *Cercariaeum squamosum* et par STUNKARD (1959) pour le cercariaeum de *Asymphyllodora amnicolae*.

Les *Bythinia* se déplacent les tentacules sensoriels en avant afin de localiser les obstacles. Ils peuvent ainsi heurter d'autres Mollusques. Les cercariaeum, qui se trouvent à l'extrémité du tentacule, vont de cette manière être en contact avec le Mollusque 2^e hôte intermédiaire.

Dès que la larve touche un autre Mollusque, elle s'accroche à ce dernier par sa ventouse orale, elle rampe sur le corps de ce Mollusque 2^e hôte, puis y pénètre afin de s'enkyster. Le passage du cercariaeum n'est possible que s'il y a contact entre deux Mollusques (phénomène déjà observé par STUNKARD en 1959).

Tous les Mollusques rencontrés dans la Cadoule sont parasités par des métacercaires de *Parasymphylodora* (*Lymnaea*, *Bythinia*, *Succinea*).

Nous avons réalisé plusieurs expériences afin de mieux comprendre ce comportement particulier.

1. Nous avons essayé de savoir si le cercariaeum change de support dès qu'il entre en contact avec un objet quelconque ou si cela ne se produit qu'avec un Mollusque vivant.

Nous n'avons jamais obtenu le passage du cercariaeum sur une aiguille montée, une tige de verre, ni sur une coquille vide de Limnée ou de Bythinie. Par contre, dès que le tentacule parasité entre en contact avec le corps d'un Mollusque, les cercariaeum quittent le tentacule et passent sur le 2^e hôte. L'infestation, dans la nature, serait donc due à la promiscuité des Gastéropodes, le passage ne se faisant que lors du contact avec le corps d'un Mollusque vivant.

Ce comportement particulier du cercariaeum lors de l'infestation peut expliquer le taux élevé du parasitisme des Gastéropodes de la Cadoule en métacercaires. Dans les *Bythinia* jouant le rôle de 2^e hôte intermédiaire, les métacercaires de *Parasymphylodora* se rencontrent durant toute l'année avec cependant un maximum en été où nous trouvons plus de 70 % de ces Mollusques parasités. En hiver, ce taux s'abaisse à 30 %.

Cette différence de taux de parasitisme peut résulter :

— d'une part, de la biologie des *Bythinies*. Durant la bonne saison, on les trouve en population dense, accrochées aux plantes aquatiques. Il y a donc énormément de contacts, d'où de nombreuses possibilités d'infestation. Par contre, en hiver, la population moins importante, se récolte sur les fonds vaseux, ce qui entraîne peu de contacts.

— d'autre part, de la biologie des cercariaeum. Nous avons remarqué, en faisant vivre les *Bythinia* parasités dans des eaux à température croissante allant de 4°C à 37°C, que les sorties des cercariaeum se produisaient avec un maximum pour une température de 20°C.

2. Nous avons ensuite mis en évidence l'influence du parasite sur le comportement du 1^{er} hôte intermédiaire.

Dès que nous touchons avec une aiguille montée un tentacule de *Bythinie* dépourvu de tout cercariaeum, il se rétracte. La même expérience réalisée avec des *Bythinia* dont les tentacules sont couverts de cercariaeum montre que ces tentacules ne se rétractent plus.

Nous nous sommes alors demandée si c'était la seule présence de cercariaeum sur le tentacule ou si c'était le fait du parasitisme viscéral par les rédies qui induisait ce changement dans le comportement du Mollusque.

Un *Bythinia* parasité par des rédies mais sans cercariaeum sur les tentacules rétracte ceux-ci dès qu'il touche un obstacle. C'est donc la présence des larves sur le tentacule qui paraît réduire les réactions tactiles. La rétraction ne s'effectue pas et ceci va faciliter le transfert d'hôte à hôte, donc favoriser le déroulement du cycle.

STUNKARD, en 1959, dit que les cercariaeum quittent un Mollusque infesté et pénètrent uniquement dans des Mollusques non parasités. Dans le biotope étudié, du fait du taux élevé de parasitisme, nous avons observé à plusieurs reprises des kystes chez des *Bythinia* parasités par des rédies.

3. Enfin, de nos observations, nous pouvons conclure qu'il y a dans la nature un choix du 2^e hôte intermédiaire. En effet, lorsqu'une *Lymnaea* est infestée par des métacercaires de *Parasymphylodora*, il y a toujours une infestation importante (10-20 kystes). Par contre, il n'y a jamais eu d'infestation massive chez les *Bythinia* où nous n'avons pas observé plus de 5 métacercaires. Dans les conditions expérimentales, nous avons cependant récolté jusqu'à 15 kystes.

Dans la nature l'hôte préférentiel est donc *Lymnaea limosa*.

Métacercaire

Les kystes sphériques mesurent en moyenne $267 \times 255 \mu\text{m}$. Ils sont entourés par une paroi mince, ce qui permet d'observer la métacercaire par transparence ou de l'extraire facilement.

De forme allongée, la métacercaire ressemble beaucoup au cercariaeum ; seuls le stylet et les glandes de pénétration ont disparu.

Cette différence anatomique confirme l'hypothèse que le cercariaeum n'est pas une véritable « cercaire », mais un stade plus avancé.

Mensurations

Longueur : 1,100 mm. Largeur : 0,460 mm. VO : $120 \mu\text{m}$. VV : $150 \mu\text{m}$. Ph : $90 \times 60 \mu\text{m}$. Vessie : $200 \mu\text{m}$ de long. Testicule : $160 \times 100 \mu\text{m}$. Poche du cirre : $150 \times 30 \mu\text{m}$. Ovaire : $80 \times 60 \mu\text{m}$.

Infestation de l'hôte définitif

L'infestation d'un *Leuciscus cephalus* le 25-V-1972 par 30 métacercaires enkystées, extraites de *Bythinia tentaculata*, a révélé lors de la dissection du Poisson le 13-VI-1972, soit 19 jours après, 17 *Parasymphylodora markewitschi* encore immatures, mais chez lesquels les glandes vitello-gènes sont nettement visibles. Il faut donc plus de trois semaines pour obtenir, chez ce Poisson, des adultes ovigères.

CONCLUSION

Le travail de BYCHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA et KULAKOVA (1970) nous a permis d'identifier le *Cercariaeum* trouvé chez *Bythinia tentaculata* dans le Midi de la France comme étant *Cercariaeum parasquamosum*.

L'appareil génital, déjà formé chez les stades larvaires, montre une anatomie identique à celle de *Parasymphylodora markewitschi* adulte trouvé naturellement chez *Leuciscus cephalus*.

Cette assimilation de *Cercariaeum parasquamosum* avec le stade larvaire du genre *Parasymphylodora* a été soupçonnée par BYCHOVSKAYA-PAVLOVSKAYA et KULAKOVA.

Les infestations expérimentales, qui nous ont permis de réaliser d'une part le passage cercariaeum-métacercaire et d'autre part le passage métacercaire-adulte, nous permettent d'affirmer que *Cercariaeum parasquamosum* est bien le stade larvaire de *Parasymphylodora markewitschi*, parasite de *Leuciscus cephalus*.

Ce Digène était connu, jusqu'à présent, chez ce Cyprinidae, sous le nom de *Asymphylogora markewitschi* et a été inclus dans le genre *Parasymphylogora* par KULAKOVA en 1972. Nos observations et notre expérimentation confirment le bien-fondé de cette nouvelle position systématique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BIGUET J., S. DEBLOCK et A. CAPRON, 1956. — Description d'une métacercaire progénétique du genre *Asymphylogora* Loos 1899, découverte chez *Bythinia leachi* Sheppard dans le Nord de la France. *Annls Parasit. hum. comp.*, **31** (5/6) : 525-542.
- BYCHOWSKAYA-PAVLOVSKAYA, I. E., et A. P. KULAKOVA, 1970. — *Cercariaeum* of the group « *Parasquamosum* » of the genus *Parasymphylogora* Szidat 1943 (Trematoda-Monorchidae). *Parazit. Sb. SSSR.*, **24** : 63-69. (En Russe.)
- DUBOIS, G., 1929. — Les cercaires de la région de Neuchâtel. *Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. nat.*, **53** (2) : 3-177. Thèse.
- KULAKOVA, A. P., 1972. — A new species of the genus *Parasymphylogora* (Trematoda-Monorchidae) and its larva. *Parazitologiya*, **6** (2) : 137-142. (En Russe.)
- KULAKOWSKAYA, O. P., 1947. — *Asymphylogora markewitschi* n. sp. Trematode digénétique des poissons du fleuve Dnieper. *Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. Républ. Ukrainienne*, **1** : 152-154. (En Russe.)
- RICHARD, J., 1971. — La chétotaxie des cercaires. Valeur systématique et phylétique. *Mém. Mus. natn. Hist. nat.*, n^{lle} sér., sér. A, Zool., **67** : 1-179. Thèse.
- STUNKARD, H. W., 1959. — The morphology and life cycle of the digenetic trematode *Asymphylogora amnicolae* n. sp. ; the possible significance of progenesis for the phylogeny of the Digenea. *Biol. Bull.*, **117** (3) : 562-581.
- SZIDAT, L., 1943. — Die Fischtrematoden der Gattung *Asymphylogora* Loos 1899 und Verwandte. *Z. Parasitenk.*, **13** (1) : 25-61.
- WESENBERG-LUND, C., 1934. — Contribution to the Development of the Trematoda Digenea. Part II. The biology of the freshwater Cercariae in Danish freshwaters. *Mém. Acad. Roy. Sci. Lett. Danemark, Sect. Sci.*, **5** (3) : 223 p.

Manuscrit déposé le 15 janvier 1976.

Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 3^e sér., n° 407, sept.-oct. 1976.
Zoologie 284 : 1107-1114.

Achévé d'imprimer le 28 février 1977.

Recommandations aux auteurs

Les articles à publier doivent être adressés directement au Secrétariat du *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. Ils seront accompagnés d'un résumé en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lequel le travail a été effectué figurera sur la première page, en note infrapaginale.

Le *texte* doit être dactylographié à double interligne, avec une marge suffisante, recto seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (à l'exception des noms de genres et d'espèces soulignés d'un trait).

Il convient de numéroter les *tableaux* et de leur donner un titre ; les tableaux compliqués devront être préparés de façon à pouvoir être clichés comme une figure.

Les *références bibliographiques* apparaîtront selon les modèles suivants :

BAUCHOT, M.-L., J. DAGET, J.-C. HUREAU et Th. MONOD, 1970. — Le problème des « auteurs secondaires » en taxionomie. *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 2^e sér., 42 (2) : 301-304.

TINBERGEN, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les *dessins* et *cartes* doivent être faits sur bristol blanc ou calque, à l'encre de chine. Envoyer les originaux. Les *photographies* seront le plus nettes possible, sur papier brillant, et normalement contrastées. L'emplacement des figures sera indiqué dans la marge et les légendes seront regroupées à la fin du texte, sur un feuillet séparé.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimées par an dans le *Bulletin*, en une ou plusieurs fois.

Une seule épreuve sera envoyée à l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours au Secrétariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou additions de texte) trop nombreuses, et non justifiées par une information de dernière heure, pourront être facturées aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exemplaires imprimés de leur travail. Ils pourront obtenir à leur frais des fascicules supplémentaires en s'adressant à la Bibliothèque centrale du Muséum : 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.

